

WEEKEND DEL TORTOLINO

A cura di Maurizio Azzolini morinellus@email.it, Antonio Antonucci earst.aa@gmail.com e Luciano Ruggieri ebnitalia@ebnitalia.it

EBN ITALIA
il birdwatching italiano



<http://www.ebnitalia.it/>

Contattare i referenti per non trovarsi tutti nello stesso posto!

Obiettivo del progetto è quello di ottenere una fotografia del flusso migratorio del Piviere tortolino.

Il weekend prescelto è quello del 6-7 settembre 2019.

E' necessario che i rilevatori eseguano su ciascun sito, le seguenti valutazioni che saranno molto importanti per l'analisi finale dei risultati.

1) Geolocalizzazione: Usare Ubird per geolocalizzare la posizione da cellulare (assolutamente preferibile). Se la posizione è incerta a causa di carenza di segnale, dovete farlo poi a casa da pc (scelta non consigliabile a meno di non avere elementi certi sulla vostra posizione).

2) Conteggio dei soggetti. Contare i soggetti lasciando gli individui tranquilli, facendoli naturalmente pedinare, senza accerchiarli. Consigliamo di rimanere seduti nell'erba perché la stazione eretta li innervosisce. Evitare assolutamente di farli involare!



3) Attribuzione dell'età dei soggetti. Per quanto possibile, assegnare due categorie ai soggetti presenti: Juv o Adulto. L'adulto pur in piumaggio invernale è facilmente riconoscibile dal JUV perché presenta copritrici non bordate di chiaro e senza centri scuri (non ha effetto "scalettato"). L'entità del contrasto della pettorina può trarre infatti in inganno. Eventualmente scattare foto. Se non riuscite a dare un'età per la brevità dell'osservazione, lasciare campo vuoto.

4) Esposizione versante. Per capire l'esposizione del versante, è opportuno sedersi orientati verso valle nel punto in cui osservate i Pivieri tortolini ipotizzando dove scenderebbe l'acqua piovana e osservare tramite bussola il punto cardinale indicato. I punti accettati sono con approssimazione N, NE, NO, S, SE, SO, O, E. Se avete una bussola digitale che vi legge i gradi, indicateli invece con precisione.

Esempio 183° Sud, oppure 221° SO.

Se siete in posizione assolutamente apicale o su cresta, segnate ZERO.

5) Pendenza versante. La pendenza del versante viene stimata in classi, secondo Guerra e Montriol (1978). Indicare la classe I-VI, non la percentuale %.

Classe	Pendenze %	Tipo di rilievo
I	0 - 2	pianeggiante
II	3 - 5	scave
III	6 - 8	moderato
IV	9 - 15	moderatamente accentuato
V	16 - 25	accentuato
VI	> 25	molto accentuato

- 5) Copertura vegetazionale. Al Piviere tortolino piacciono i suoli nudi. Ma quanto nudi? Individuare un punto casuale dove hanno sostato i Pivieri e su un quadrato di suolo di 1 metro x 1 metro dare un valore alla superficie nuda (=sassi, pietre o terreno senza vegetazione) secondo una scala da 1 a 10.
1 solo suolo nudo, 10 solo erba.
- 6) Altezza vegetazione erbacea. Sedetevi per terra in un punto frequentato dai Pivieri e misurate l'altezza del substrato erbaceo con un righello, da terra. Non sollevate le erbe prostrate e non raddrizzatele in nessun modo allungando lo stelo. Scrivete la misura in millimetri. Esempio 23 mm.

SITO:	ALTITUDINE m slm :	
1) NUMERO TOTALE:	di cui ADULTI :	JUV:
2) ESPOSIZIONE		
3) PENDENZA		
4) COPERTURA		
5) ALTEZZA VEGETAZIONE		

Ricordarsi che il dato deve essere georeferenziato su Ubird.

Se non siete registrati, fatelo! E' gratis <https://ubird.ebnitalia.it/it/news-3/registrazione.html>